

Vögel (Aves)

Allgemeines

Vögel nehmen als Nützlinge in der Schädlingsbekämpfung einen wichtigen Platz ein. Nichts desto trotz können einige Vogelarten schädigend auftreten, deren einzelne Lebensweisen hier aufzuführen den Rahmen sprengen würde. Zu nennen sind hierbei: Amsel, Drossel, Star, Krähe, Eichelhäher, Dompfaff u. a..

Schaden und Symptome

Der erste Schaden zeigt sich häufig bereits in der Plünderung der noch ruhenden Knospen (z.B. Dompfaff). Später können auch Blüten und Früchte beschädigt und abgerissen werden. Durch einen frühen Befall - häufig von Januar bis März - kann bereits der Austrieb kümmerlich erfolgen.

Diagnose

Bereits im Knospenstadium sollte auf Befall in Form von ab- bzw. angehackten Knospen geachtet werden. Geschädigte Früchte sind abgerissen, bzw. verzehrt.

Bekämpfung

- Heidelbeersträucher mit Kunststoffnetzen überspannen
- Einsatz von Schreck-Vorrichtungen (Vogelscheuchen, Staniolstreifen etc.) begrenzt wirksam
- Einsatz von akustischen Methoden
- chemische Methoden sind grundsätzlich verboten