

Raspberry Yellow Dwarf (Arabid mosaic virus & Strawberry latent ringspot virus)

Einordnung

Das Arabis-Mosaik-Virus gehört zur Gruppe der Nepo-Viren. Das strawberry latent ringspot virus wurde lange als Nepo-Virus angesehen. Heute ordnet man es jedoch wegen seiner abweichenden Proteinstruktur nur noch unverbindlich dieser Gruppe zu.

Symptome und Schaden

Junge Ranken sind kümmerlich und bringen entweder nur kleine oder aber gar keine Früchte mehr hervor. Auf den Blättern erscheint eine feine chlorotische Sprenkelung. Bei Blättern, die weiter unten sitzen, kann eine deutliche Adernvergilbung oder eine netzartige Chlorose auftreten. Teilweise sind die Blätter unnatürlich gewachsen oder nach unten gekräuselt. Infizierte Pflanzen wirken kümmerlich und gestaucht, so daß im Bestand lichte Stellen entstehen.

Übertragung

Beide Viren werden durch die Nematodenart *Xiphinema diversicaudatum* übertragen. Sie können aber auch mit dem Saft (Veredeln) oder durch Samen verbreitet werden.

Diagnose

Für eine genaue Bestimmung muß ein Virustest durchgeführt werden.

Bedeutung

Die Krankheit tritt nur selten auf. Bei starkem Befall kann es zu beträchtlichen Ernteverlusten kommen.

Bekämpfung

- gesundes Pflanzgut verwenden
- resistente Sorten verwenden